

又到吃瓜季节, 哪些品种好吃? 哪些品种香甜?

2022 年全省十大优秀西甜瓜品种出炉

眼下, 正是吃瓜时节, 不同品种的西瓜、甜瓜陆续成熟上市。那么, 哪些品种好吃? 哪些品种香甜? 6 月 10 日, 2022 年浙江省瓜菜新品种现场观摩培训与西甜瓜品鉴会在湖州举行。来自全省各市和有关县(市、区)种子管理部门、浙江种业博览会瓜菜新品种展示中心及各分中心、科研院所、种子企业等单位的 60 余位代表参会。会上, 与会专家对参展单位提供的 43 个西瓜品种和 38 个甜瓜品种进行了品鉴与评选, 根据西甜瓜的糖度、口感、外观、剖面等方面进行综合打分, 最终评选出“提味”“浙蜜 8 号”“天露小黄”“超新星”“兰蕙”等 5 个西瓜品种, “浙甜 401”“丰登蜜 25”“浙甜 105”“味萌 1 号”“翠雪 7 号”等 5 个甜瓜品种为 2022 年度浙江省十大优秀西甜瓜品种。

我省西甜瓜栽培面积大、产值高, 常年种植面积在 130 多万亩, 年产值 70 多亿元。近年来, 为推进西甜瓜产业高质量发展, 我省加快推进瓜菜种质资源的收集鉴定和创制利用, 加大西甜瓜良种繁育联合攻关, 加快选育一批符合市场需求的突破性品种。同时, 进一步加强新品种展示示范和品种跟踪评价, 建立一批“看禾选种”窗口, 加快西甜瓜品种更新换代。目前, 一批性状优秀的西甜瓜新品种已崭露头角。

徐叶丹 王征鸿



十大优秀西甜瓜品种简介

西瓜品种

提味

中熟, 长势中等, 春季栽培全生育期 115 天, 果实发育期约 45 天。果形近圆球, 果皮底色浅绿, 有条纹, 平均单果重 6.5 公斤左右, 瓜肉粉红色, 肉质细嫩松脆, 多汁爽口, 中心可溶性固形物含量 12.4% 左右, 边缘 8.8% 左右。

选育单位: 宁波微萌种业有限公司



浙蜜 8 号

春季授粉到成熟约 32 天, 单瓜重 5 千克, 亩产 3000 公斤左右。瓜瓤红色, 肉质松脆, 口感好, 中心可溶性固形物含量 12.5%, 边缘 10.1%, 商品性强。适宜浙江、江苏、河南、安徽、云南等地设施栽培。


选育单位: 浙江勿忘农种业股份有限公司



天露小黄

长势中等, 早春大棚播种全生育期 100 天左右, 果实发育期 29 天左右; 果实椭圆形, 单果重 2—3 公斤; 瓜瓤黄色, 汁多鲜嫩, 口感好, 中心可溶性固形物含量 12%—13% 之间。耐低温, 抗病力较强, 坐果性好, 亩产约 2200 公斤。

选育单位: 平湖天露西瓜研究所



超新星

中熟品种, 春季授粉到成熟约 36 天, 一般单瓜重 6 公斤以上, 产量较稳定, 丰产性好。果肉红色, 质地脆甜爽口, 果肉细腻, 中心可溶性固形物含量 12% 左右, 较耐储运, 适宜国内西瓜主产区保护地种植。

选育单位: 浙江勿忘农种业股份有限公司



兰蕙

生长势中等, 春季栽培全生育期约 96 天, 果实发育期约 32 天。果实高圆形, 瓜色绿底覆深绿色镂空齿条, 瓜瓤鲜黄, 肉质松脆, 瓜汁多, 中心可溶性固形物含量 12.3%, 平均单果重 1.5 公斤。适合春秋两季设施栽培。

选育单位: 宁波市农科院



甜瓜品种

浙甜 401

早中熟品种, 果实椭圆形, 成熟果白皮白肉, 甜而不腻, 瓜瓤中心可溶性固形物含量 16.5% 以上, 平均单果重 1 公斤左右; 春季大棚栽培, 果实发育期 42 天左右, 平均单果重 1.2 公斤左右。亩产量: 立架栽培约 2400 公斤, 爬地栽培约 4000 公斤。适宜全省春秋季节设施栽培。

选育单位: 浙江大学



丰登蜜 25

植株生长势强, 果实椭圆形, 网纹中密, 单果重约 1.7 公斤左右, 绿皮橙肉, 肉质脆, 口感爽甜, 中心可溶性固形物含量 16% 左右。果实发育期 45 天左右。该品种特点: 网纹美观, 不易裂瓜, 抗病性好, 商品率高。

选育单位: 宁波市农科院



浙甜 105

早熟品种, 皮厚, 肉质松脆, 口感鲜甜。果实椭圆形, 成熟果皮白色, 果肉浅橙色, 中心可溶性固形物含量 16.0% 以上。春季大棚栽培, 果实发育期 38 天左右, 平均单果重 1.6 公斤左右, 亩产量 2000 公斤左右, 适宜全省春季设施栽培。

选育单位: 浙江大学



味萌一号

中熟品种, 长势中等, 坐果至成熟 46—48 天。果实高球形, 纵径 14.0 厘米, 横径 12.2 厘米。灰绿色底, 木栓组织细密且稳定, 肉色绿色, 肉质松软、细腻, 风味浓郁。中心可溶性固形物含量 8%—15%, 单瓜重 1.2—1.8 公斤。

选育单位: 宁波微萌种业有限公司



翠雪 7 号

早中熟品种, 果型椭圆, 皮厚, 白皮白肉, 具有味甜, 肉质松脆、口感清爽特点, 中心可溶性固形物含量在 16% 左右, 果实发育期 35—38 天, 平均单果重 1.5 公斤以上, 适合全省冬春季大棚早熟爬地栽培及春季大棚栽培。

选育单位: 浙江省农科院

