

2025长江下游(浙江)油菜新品种大会在杭举行

十大优秀油菜品种公布

□见习记者 张栢元

本报讯 近日,2025长江下游(浙江)油菜新品种大会在杭州举行。大会以“种铸黄花芯 香飘共富路”为主题,通过油菜新品种、新农机、新产品等的展示、示范、观摩,加快油菜优良新品种选育和推广应用,推进油菜大面积单产提升。大会还公布了十大优秀油菜品种。

记者在杭州市原种场油菜品种展示区看到,绿油油的角果孕育出一颗颗饱满的油籽。“现场设置油菜新品种展示示范区、油菜新农机展示区、油菜全产业链相关新产品展示区3个板块,包括80个次新品种,油菜毯状苗移栽机等新型农机具,菜籽油、文创产品等全产业链产品。”省种子管理总站相关负责人介绍。

现场,多家种业和加工企业负责人忙着对接洽谈,交流推广优质油菜品种。“‘浙油杂59’的综合性状好,高产又稳产,不仅抗病性好,耐病性也强,枯黄后不掉果子。这个品种含油量45.76%,粗榨后的毛油很清亮。”浙江勿忘农种业股份有限公司早作部经理张泉锋介绍,2022年至今,“浙油杂59”全国累计推广面积超50万亩。

“浙油杂59”以其优秀的表现入选十大优秀油菜品种。同样入选的还有浙江省农科院选育的“越优1203”、中国农科院油料作物研

究所和湖北洪山实验室选育的“中油杂41”浙江勿忘农种业股份有限公司选育的“浙农油12”、华中农业大学和武汉联农种业科技有限责任公司选育的“圣缘2号”、江苏省农科院选育的“鸿优789”、浙江省农科院选育的“越优577”、安徽省农科院作物研究所选育的“徽R098”、陕西省杂交油菜研究中心选育的“秦优1718”、温州嘉友种业有限公司选育的“嘉友740”。

相关链接

十大优秀油菜品种介绍

越优1203

甘蓝型杂交种,株高175.8厘米,主花序有效长度和有效角果数分别为59.3厘米和66.4个,单株有效角果数480.4个,每角实粒数23.4粒,千粒重4.3克。芥酸含量0.2%,硫苷含量29.46微摩尔/克,含油量45.74%。低感菌核病,抗倒性强。第一生长周期亩产206.4千克,第二生长周期亩产197.6千克。适宜上海、浙



江以及江苏和安徽两省的淮河以南冬油菜区种植。

鸿优789

食用油类型品种,冬性,生育期227天,杂交种,甘蓝型。苗期生长习性半直立,开花期中,角果姿态平伸,籽粒黑褐色。株高171.20厘米,单株有效角果数378.1个,每角粒数23.9粒,千粒重4.67克。芥酸含量0.31%,硫苷含量27.04微摩尔/克,含油量48.57%。低抗菌核病,低抗病毒病,具有非转基因抗磺酰脲类除草剂特性,抗寒性较强,抗裂荚性较好,抗倒性



强。第一生长周期亩产218.7千克,第二生长周期亩产189.2千克。适宜在浙江、安徽、江苏、湖南、湖北、江西、四川、贵州、重庆、陕西陕南、甘肃陇南地区种植。

中油杂41

食用油类型品种,全生育期205天,杂交种,甘蓝型,半冬性。苗期生长习性半直立,开花期中,角果姿态上举,籽粒黑褐色。株高183.40厘米,单株有效角果数180.40个,每角粒数21.40粒,千粒重4.72克。硫苷含量22.06微摩尔/克,含油量51.29%。低感菌核病,抗病毒病,抗倒性较强。第一生长周期亩产200千克,第二生长周期亩产158.9千克。适宜在江苏和



安徽两省淮河以南、浙江、上海、四川、贵州、云南、重庆、湖北、湖南、江西、陕西汉中 and 安康地区冬油菜主产区种植。

越优577

食用油类型品种,甘蓝型,杂交种,生育期220天。苗期生长习性半直立,开花期早,角果姿态平伸,籽粒黑褐色。株高177.94厘米,单株有效角果数377.81个,每角粒数22.54粒,千粒重4.14克。芥酸含量0.027%,硫苷含量22.84微摩尔/克,含油量47.97%。低感菌核病,抗倒性强。第一生长周期亩产207.3千克,第二生长周期亩



产220.5千克。适宜在长江中、下游生态区的湖北、湖南、江西、上海、浙江以及江苏和安徽两省淮河以南区域秋季种植。

浙农油12

食用油类型品种,甘蓝型常规种,冬性,生育期222天。苗期生长习性半直立,开花期中,角果姿态上举,籽粒黑褐色。株高169.30厘米,单株有效角果数739.6个,每角粒数22.3粒,千粒重4.00克。硫苷含量21.48微摩尔/克,含油量49.71%。低抗菌核病,中抗病毒病,抗寒性较好。第一生长周期亩产183.5千克,第二生长周期亩产



191.6千克。适宜在浙江、江苏、安徽、上海冬油菜区秋冬季节种植。

徽R098

食用油类型品种,甘蓝型,冬性,生育期219天,杂交种。苗期生长习性半直立,开花期中,角果姿态平伸,籽粒黑褐色。株高181.72厘米,单株有效角果数363.9个,每角粒数22.1粒,千粒重4.48克。芥酸含量0.12%,硫苷含量25.32微摩尔/克,含油量47.08%。低抗菌核病,低抗病毒病,抗倒性强,抗裂荚性好。第一生长周期亩产225.8千克,第二生长周期亩



产235.5千克。适宜在长江下游的安徽和江苏两省的淮河以南以及浙江、上海的冬油菜主产区种植。

圣缘2号

甘蓝型,生育期215天,杂交种。苗期生长习性半直立,开花期中,角果姿态上举,籽粒黑褐色。株高189.77厘米,单株有效角果数266.9个,每角粒数29.0粒,千粒重4.35克。硫苷含量22.64微摩尔/克,含油量49.75%。低抗菌核病,抗病毒病,抗寒性强,抗裂荚性中等,抗倒性强。第一生长周期亩产212.3千克,第二生长周期亩产214.6千克。适宜在四川、重庆、



贵州、陕西、湖北、湖南、江西、上海、浙江以及安徽与江苏两省的淮河以南秋季种植。

秦优1718

杂交种,甘蓝型,生育期209.3天。苗期生长习性半直立,开花期中,角果姿态平伸,籽粒颜色褐色。株高176.8厘米,单株有效角果数220个,每角粒数22.2粒,千粒重3.85克。芥酸含量0%,硫苷含量25.17微摩尔/克,含油量47.38%。低抗菌核病,中抗病毒病,中抗白粉病。抗倒性强,抗病性强,较抗裂荚,抗寒性中等。第一生长周期亩产188.61千克,第二生长周期亩产



175.55千克。适宜在湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、上海、四川、贵州、云南、重庆、陕西南部长江流域生态区秋季种植。

浙油杂59

甘蓝型品种,生育期208.7天,杂交种,苗期生长习性半直立,开花期早,角果姿态上举,籽粒黑褐色。株高174.1厘米,单株有效角果数225.7个,每角粒数20粒,千粒重3.92克。芥酸含量0.43%,硫苷含量30.72微摩尔/克,含油量45.76%。低抗菌核病,中抗裂角。第一生长周期亩产175.00千克,第二生长周期亩产182.72千



克。适宜在江苏、安徽、浙江、上海、湖北、湖南、江西冬油菜区秋冬季种植。

嘉友740

食用油类型品种,甘蓝型杂交种,冬性,生育期184天。苗期生长习性匍匐,开花期中,角果姿态上举,籽粒褐色。株高167.70厘米,单株有效角果数431.4个,每角粒数21.0粒,千粒重4.50克。芥酸含量0.05%,硫苷含量27.69微摩尔/克,含油量51.33%。低抗菌核病,中抗病毒病,抗寒性、抗裂荚性、抗倒性好。第一生长周期亩产205.6千克,第二生长周期亩产204.2千



克。适宜在湖北、江西、浙江以及安徽和江苏淮河以南地区、江苏淮河以北地区、贵州、四川秋季种植。